

®FILLERPROXIDIL فيلبروكسيديل محلول للشعر

عامل النمو البطاني الوعائي النانوي VEGF مرجعية مستحضرات التجميل الطبية

عبوة تحتوي على: 01 شامبو 120 مل + 01 بلسم 120 مل + 04 أمبولات 6 مل لكل وحدة
و 01 مكمل غذائي 240 جرام.

لا تستخدم هذا المنتج إذا كنت تعاني من جروح أو إصابة في الجلد.

تعتمد فعالية هذا الدواء على القدرة الوظيفية للمريض.

أمبولة فيلبروكسيديل ®Fillerproxidil شفافة إلى محلول مصفر قليلاً.



ما هو الغرض من هذا العلاج؟

يستخدم فيلبروكسيديل ®Fillerproxidil للعلاج الموضعي للثعلبة الأندروجينية، والثعلبة البقعية، وتتساقط الشعر الكريبي، وفروة الرأس الدهنية، وقشرة الرأس. حيث يعمل على تنظيف بصيلة الشعر ويفحز نمو الشعر.

كيف يعمل فيلبروكسيديل ®Fillerproxidil؟

يعمل فيلبروكسيديل ®Fillerproxidil عن طريق عكس ضمور البصيلات الناجم عن هرمون DHT. يزيد من حجم البصيلات. يحفز تولد الأوعية الشعرية: ظهور شعيرات دموية جديدة تحيط بصيلة الجديدة - وهو أمر ضروري لتغذية الشعر وحيويته. مع تطبيق فيلبروكسيديل ®Fillerproxidil مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهر، تبدأ النتائج في الظهور. يبدأ الشعر الجديد في النمو ويقل تساقط الشعر. نوصي بتطبيق مجموعة فيلبروكسيديل ®Fillerproxidil لمدة ثلاثة أشهر لتحقيق نتائج 100٪ لوقف تساقط الشعر ولكي يصبح نمو الشعيرات الجديدة واضحًا. قد يختلف الأفراد في كمية الشعر الذي سيعاد نموه والوقت الذي يستغرقه لتحقيق أفضل النتائج.

ملاحظات وموانع

قبل استخدام فيلبروكسيديل ®Fillerproxidil، تأكد من صحة فروة الرأس. لا تستخدمه إذا كان الجلد أو فروة الرأس مصاباً، أو ملتهياً، أو محمرًّا، أو متهيجًّا، أو مسيبة إلى ألم، أو تحت ظروف حرارة الشمس أو التهاب الجلد. لا تستخدم المنتج إذا كان لديك رد فعل تحسسي تجاه أي من مكونات التركيبة. يحتوي فيلبروكسيديل ®Fillerproxidil على ميثيل نيكوتينات في تركيبته، وهو نشط مفترط الدم، وحيوي، وموسِّع للأوعية، مما يسبب أحمراء وإحساساً طفيفاً بالاحترار الموضعي. هذا التأثير الطبيعي وضروري بحيث يكون هناك زيادة في أكسجة الدم، وهو أمر ضروري في عملية تحفيز ظهور شعر جديد. لا يسبب الحساسية. تستمر التأثيرات لمدة 3-5 دقائق بعد التطبيق. بعد وضع الأمبولة، انظر 15 دقيقة على الأقل قبل استخدام مجففات الشعر، أو الجل أو الكريمات أو سراي تثبيت الشعر. انتظري 4 ساعات على الأقل قبل غسل شعرك مرة أخرى، إذا لزم الأمر. ضع جرعة إجمالية قدرها 6 مل من الأمبولة على فروة الرأس، مرة واحدة في الأسبوع، بدء التطبيق في وسط المنطقة المصابة (6 قطرات أو 1 مل لكل تطبيق). حتى لا تتأثر فعالية المنتج في الحالات التي تشهد فقدان شعر مفاجئ أو متقطع، صنع كامل أو فقدان الشعر في الجسم بأكمله، لا ينصح باستخدام هذه المنتجات. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان سبب تساقط الشعر يرجع إلى استخدام بعض الأدوية، أو نقص حاد في العناصر الغذائية، أو خلال فترة العلاج الكيميائي، أو أمراض أو حالات تتسبب في تلف فروة الرأس، يجب تجنب استخدام هذه المنتجات. لا ينبغي استخدامه إذا كان هناك تاريخ عائلي لتساقط الشعر أو إذا كان سبب تساقط الشعر غير معروف. ينصح بمراجعة الطبيب قبل الاستعمال. لا يتداخل استخدام الصبغات أو التinteis أو التجعيد مع عمل المنتج. ومع ذلك، لتجنب أي تهيج موضعي، تأكد من عدم وجود فيلبروكسيديل ®Fillerproxidil على فروة الرأس قبل استخدام أي مواد كيميائية. للحصول على أفضل النتائج، لا تقم بتطبيقات المنتج في نفس يوم الإجراءات الكيميائية على الشعر. قم بتخزين المنتجات في درجة حرارة الغرفة (بين 15 درجة منوية و 30 درجة منوية). يجب الحماية من الضوء والحرارة والرطوبة. احفظ الزجاجات مغلقة باحكام بعد الاستعمال.

كيف يمكنني استخدام المنتجات؟

نظرًا لحقيقة أن مجموعة فيلربروكسيديل Fillerproxidil® تتكون بالكامل من المنتجات الموضعية (باستثناء المكمّلات الغذائية - الجيلاتين)، فإنه يعتبر أكثر فعالية من مستحضرات التجميل الجلدية الأخرى عند وضعه مباشرة على المنطقة المصابة. أظهرت 100٪ من المشاركون انخفاضًا في تساقط الشعر في التقييمات السريرية.

موضع الاستخدام: يجب أن توضع المنتجات على فروة الرأس، باستثناء المكمّلات الغذائية (الجيلاتين)، والتي يجب تناولها عن طريق الفم، كما هو محدد.

الأثار الجانبية: من خلال الاختبارات السريرية استنتج أن منتجات Fillerproxidil® لا تسبب أي ردود فعل سلبية لاستخدامها أظهرت الدراسة أنه لم يصرح أي مشارك بعدم الراحة بعد استخدام المنتجات. لم يتم الكشف عن أي علامات سريرية لردود فعل سلبية.

الشامبو والبلسم والأمبولة: تطبيق مرة واحدة في الأسبوع.

اغسل الشعر بشامبو فيلربروكسيديل Fillerproxidil®, ضعي المنتج على راحة اليدين ووزعيه مباشرة على فروة الرأس المبللة. قومي بعمل تدليك خفيف بأطراف أصابعك واتركيه لمدة 3 دقائق. لتنظيف وتطهير أفضل، كرري العملية. اغسليه جيداً بالماء.

ملاحظة: هذا الشامبو هو علاج لفروة الرأس. لذلك لا ينصح باستخدامه لغسل الشعر. تكفي الرغوة التي تتشكل في التطبيق لتنظيف الشعر أثناء استخدام الشامبو.



ضعى بلسم فيلربروكسيديل Fillerproxidil® على كامل طول الشعر بعيداً عن فروة الرأس. دلكي الشعر برفق وانتظرى 3 دقائق. اشطفيه جيداً وجففيه بمنشفة.



ثم ضعى أمبولة فيلربروكسيديل Fillerproxidil® مباشرة على فروة رأس رطبة. قومي بعمل تدليك دائري خفيف بأطراف الأصابع لا تشطفيه. انتظر لمنطقة 15 دقيقة حتى يتم امتصاص المكونات النشطة بالكامل. أنهى تسوية شعرك كما تشاء.



تناولى 2 (حبتين) من المكمّلات الغذائية (الجيلاتين) في اليوم. الاستهلاك اليومي للمكمّلات الغذائية ضروري للحصول على نتائج جيدة.

